

## Wädenswiler Staudenhecke (früh austreibender Typ)

### Charakter:

Die Calamagrostis x acutiflora `Karl Foerster` erreichen Ende Mai schon eine beachtliche Höhe und mit der Juniblüte ist die Zielhöhe von 180cm im Frühsommer bereits erreicht. Die Kombination von Gräsern und Blütenstauden ist sehr ausgewogen. Bei einer streng linearen Variante bilden die Calamagrostis, in die Beetmitte gesetzt, die klassische Grenze des Gartenraums. Die Geranium `Rozanne` klettern bis zum Halmansatz der Calamagrostis empor und erzeugen mit ihrer Blütenfülle so eine hervorragende Fernwirkung. Die Schleppe der permanent blühenden Geranium deckt den Boden perfekt ab. Es besteht weder ein Unkrautdruck noch die Gefahr des Einwucherns der Rasenwege.

### Verwendung:

Die Staudenhecken kommen vor allem als platz sparende Elemente zum Einsatz (geringe Breite ab 80 cm), z. B. in Reihenhausgärten oder auf schmalen, kleinen Grundstücken (keine Grenzabstandsregeln).

### Spezielle Pflegehinweise:

Der Pflegeaufwand ist sehr gering, es reicht in der Regel ein kompletter Rückschnitt pro Jahr aus. Dieser erfolgt beim Ausklang des Winters, vor dem Austrieb der Zwiebelpflanzen. Das Schnittgut kann als Mulchmaterial in der Pflanzung belassen werden. Den ersten Schnee vertragen die Stauden recht gut und sie richten sich meist beim Abtrocknen wieder auf. Um den Unkrautwuchs zu unterbinden sind vor allem in der Anfangsphase - bis sich die Pflanzendecke geschlossen hat - Jätgänge in kurzen Intervallen wichtig. Wurzelunkräuter müssen so schnell wie möglich entfernt werden. Dies geschieht idealerweise bei feuchtem Boden: Unkräuter mit weit reichenden Wurzeln mit einer Grabgabel ausgraben, und pfahlbildende Unkräuter mit einem Unkrautstecher ziehen. Samenunkräuter müssen vor dem Samenflug gejätet werden

### Blütendiagramm

	Anzahl/10m <sup>2</sup>	Höhe/cm	Farbe und Blütezeit	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Bemerkungen/ Austrieb/ Pflanztipps
Anemone japonica 'Serenade', Herbansternemone	5	80	rosa, Juli-Okt.													spätaustreibend S-C, zu Ceratostigma setzen
Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster', Reitgras	15	150	gelbbraun, Juli.-Aug.													frühaustreibend, S-C, bandartig mittig auslegen
Ceratostigma plumbaginoides, Chinesische Bleiwurzel	15	25	blau, Aug.-Okt.													spätaustreibend, C-S, schattig, zu Anemone setzen
Geranium pratense 'Rozanne', Storchschnabel	10	40	violettblau, Mai-Okt.													mittel, C, Dauerblüher, kletternd
Hesperis matronalis, Nachtviole	10	70	violett, Mai-Juli													frühaustreibend, R, duftend, kurzlebig
<b>Zwiebeln</b>																
Allium aflatunense 'Purple Sensation', Zierlauch	40	90	purpurviolett, Mai-Juni													Schnitt, Tuffs 3-5 Stk., zu Calamagrostis setzen
Chionodoxa luciliae, Schneeglantz/-stolz	50	15	blau m. weisser Mitte, März													flächig ausbringen, verwildert
Crocus vernus blau ('Remembrance' + 'Pickwick')	50	10	blauviolett, März-April													flächig ausbringen
Hyacinthus orientalis, Garten-Hyazinthe	40	25	rosa, April-Mai													duftend
oder																
Tulipa Darwin Hybr. 'Pink Impression', Tulpe	40	55	malvenrot, Mitte April													auf leichte Böden
C = Konkurrenz Strategen, R = Ruderal Strategen, S = Stress Strategen																